

Staatl. Preuß. Chir. Univ.-Klinik Münster i. W.  
(Direktor: Prof. H. Coenen.)

---


Die praemature Synostose der Halswirbelsäule  
(Klippel-Feil'sches Syndrom)  
und ihre Deutung.

# Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde der Hohen  
Medizinischen Fakultät der Wilhelms-Universität  
zu Münster (Westf.)

vorgelegt von

Hans Timmerkamp, Castrop-Rauxel i. W.



---

Druck von Ziegemeyer & Co., Bünde i. W.

Referent: Privatdozent Dr. H. Walter.

Correferent: Prof. Dr. Coenen.

Dekan: Prof. Dr. Vogt.



MEINEN LIEBEN ELTERN  
IN DANKBARKEIT UND VEREHRUNG  
GEWIDMET



Digitized by the Internet Archive  
in 2026

## Die praemature Synostose der Halswirbelsäule (Klippel-Feil'sches Syndrom) und ihre Deutung.

1912 stellten M. Klippel und A. Feil in Paris bei Gelegenheit einer Demonstration ein Krankheitsbild mit den Hauptsymptomen: Fehlen des Halses, tiefer Haaranatz und Hemmung der seitlichen Halsbewegungen auf. Da der vorgestellte Patient an einer interkurrenten Krankheit starb, konnte auch die anatomische Grundlage dieser Mißbildung klargestellt werden. Es handelte sich um eine vollständige Synostosierung der Halswirbelsäule; die einzelnen Wirbel waren nicht mehr zu erkennen. Sie bildeten einen einzigen Block, von Klippel und Feil als „masse dorsocervicale“ bezeichnet. Anscheinend bestand der Block aus vier Wirbeln. Atlas und Epistropheus waren nicht vorhanden, es bestand durchgehende Spina bifida. Zwischen Hinterhaupt und Kreuzbein fanden sich im ganzen nur 12 Wirbel.

Dubreuil-Chambardel haben gelegentlich einer Zusammenfassung gleicher und ähnlicher Fälle im Jahre 1921 zuerst den Ausdruck „Klippel-Feil'sches Syndrom“ gebraucht. 1927 stellte P. Siwon in der Festschrift für Garré etwa 30 bis dahin bekannte Krankheitsfälle zusammen. Die meisten Mitteilungen stammten aus Frankreich und Italien; 3 Fälle wurden in Amerika publiziert.

Im folgenden soll kurz auf einige in den letzten Jahren erfolgte Mitteilungen eingegangen werden. F. Partsch beschrieb 1925 ein junges Mädchen mit den oben genannten Hauptsymptomen.

Das Röntgenbild ergab eine Synostose des 2. bis 6. Halswirbels, auffällige Verringerung der Wirbelsäule, Fehlen des hinteren Bogens des Atlas und Epistropheus. Harald Nilsson berichtete 1928 über 2 Fälle, die 2 Mädchen von

2 und  $2\frac{1}{4}$  Jahren betrafen. Es bestand eine erhebliche Verkürzung des Halses, der Kopf wurde stark vorgebeugt gehalten. Die Beweglichkeit war sehr herabgesetzt. Das Röntgenbild zeigte im ersten Falle, daß die Halswirbelsäule und die obersten Brustwirbel eine zusammenhängende Masse bildeten, im zweiten Falle war eine ausgesprochene Hypoplasie der Halswirbelsäule und knöcherne Verbindung der 3 unteren Halswirbel deutlich zu erkennen.

Bei beiden Mädchen fand sich Spina bifida, beim ersten C. 6-Thl., beim zweiten angedeutet Th. 2-3. Die Skapula stand bei beiden Kindern hoch, im ersten Falle unbedeutend, im zweiten war sie stark fixiert, wodurch die Elevation des Armes erheblich eingeschränkt war. P. Ingelrans (Lille) beschrieb 1926 einen Knaben, bei dem er knöcherne Verschmelzung aller Halswirbel zu einem Block feststellte. Außerdem bestand Schiefstellung des Kopfes mit Bewegungseinschränkung nach allen Richtungen. Derselbe Autor veröffentlichte 1928 zusammen mit O. Piquet (Lille) 2 Fälle, bei denen es sich um multiple Mißbildungen handelte.

Der erste, ein vierzehnjähriges Mädchen, wies außer dem Klippel-Feil'schen Syndrom der Halswirbelsäule eine doppelseitige Sakralisation des 5. Lendenwirbels, eine Rachischisis des 1. Sakralwirbels, endlich eine angeborene Klumphand auf. Bei dem zweiten, einem siebenjährigen taubstummen Mädchen, handelte es sich außer der Mißbildung der Halswirbelsäule um eine Spina bifida occulta des 2. Lendenwirbels. H. Heidecker (Breslau) berichtete im Jahre 1928 über ein untersetztes achtjähriges Kind, das im Alter von sieben Monaten geboren war. Es hatte einen kurzen, gedrungenen Hals, die Haargrenze stand tief und die Beweglichkeit des Kopfes war stark eingeschränkt. Röntgenologisch zeigten sich die Halswirbel als eine zusammenhängende Masse mit durchgehender Spaltbildung. Die Halswirbelsäule war stark verkürzt. Atlas und Occiput waren verschmolzen. Außerdem fanden sich weitere Anomalien an der Brustwirbelsäule und am Thorax. Die Schulterblätter standen normal hoch.

Es ist noch umstritten, welche Anomalien der Halswirbelsäule oder welche Ausdehnung der Synostose man als Klippel-Feil'sches Syndrom bezeichnen soll. Zum Beispiel protestierte M. Boehm auf dem deutschen Orthopädenkongreß 1925 in Hannover gegen die Bezeichnung Klippel-Feil'sches Syndrom. Es handele sich hier um Fälle von „homme sans col“, die er schon 1909 als ossären Schiefhals demonstriert und bezeichnet habe. Boehm bezieht sich hier auf seine 1909 in der Berliner Klinischen Wochenschrift über die numerische Variation des menschlichen Rumpfskeletts erschienene Arbeit. Hierin zeigte er, daß Veränderungen der Halswirbelsäule kongenitalen Schiefhals verursachen können. Er beschrieb damals 2 Fälle mit Atlas-Assimilation, 2 Fälle, bei denen der zweite und dritte Halswirbel und einen Fall, bei dem die obersten Halswirbel synostotisiert waren. F. Partsch schloß sich dem Proteste Boehms mit der Begründung an, daß diese Mißbildung schon früher im deutschen Schrifttum bearbeitet und veröffentlicht worden sei. Er schlägt den Namen „Kongenitale Halswirbelsynostose mit (oder ohne) Spina bifida“ vor. Hier muß aber daran erinnert werden, daß Jackson Clarke schon 1906 in der Londoner Clinical Society einen Mann mit ausgeprägtem Klippel-Feil'schen Syndrom vorstellte. B. Valentin (Hannover) trat Boehm auf demselben Kongreß entgegen. Er meint, daß man den Begriff des Klippel-Feil'schen Syndroms enger fassen solle und bekräftigte diese Ansicht dadurch, daß er 2 Fälle von ossärem Schiefhals demonstrierte und diese 2 anderen Fällen mit Klippel-Feil'schem Syndrom entgegenstellte. Es ist zuzugeben, daß es sich bei manchen Fällen von kongenitalem, ossärem Schiefhals, Einzelsynostosen und ähnlichen Mißbildungen um Teilsymptome einer Mißbildung handelt, die im Klippel-Feil'schen Syndrom ihre höchste Ausbildung zeigt. H. U. Kallius meint, daß man solche Fälle wohl als „abortive Formen“ des Klippel-Feil'schen Syndroms auffassen könne; nach seiner wohlberechtigten Ansicht würde aber eine Zusammenfassung aller derartigen Mißbildungen unter dem Namen Klippel-Feil'sches

Syndrom eine Verwischung der klinischen Bedeutung des eigentlichen Krankheitsbildes herbeiführen.

A. Feil unterschied 1919 in seiner Doktor-Dissertation 3 Arten:

1.) Die teilweise numerische Reduktion der Halswirbelelemente.

2.) Völliges Fehlen der Halswirbelsäule.

3.) Die teilweise numerische Reduktion der Wirbelsäule, nicht auf die Halswirbel beschränkt, sondern sich auf die ganze Wirbelsäule erstreckend.


Feil macht also für die Verkürzung der Halswirbelsäule, die ja das hervorstechendste Merkmal des Klippel-Feil'schen Syndroms ist, die numerische Reduktion der Wirbelelemente verantwortlich. Dem ist aber entgegen zu halten, daß die Wirbelanlagen vorhanden gewesen sein müssen, weil Zwischenwirbellöcher vorhanden sind und Wurzelsymptome fehlen, aus denen man auf eine Mißbildung des Markes schließen könnte. (f. U.) Es bleibt immerhin möglich, daß eine Reduktion der Wirbelelemente mit im Spiele ist. Das Wesentliche ist jedoch nach H. Walter die frühzeitige Verknöcherung wahrscheinlich schon im verknorpelten Stadium, wodurch das Längenwachstum aufgehoben wird. Walter nimmt eine Aplasie der Zwischenwirbelscheiben an, wodurch die Verknöcherung ungehindert über die einzelnen Segmente hinwegschreiten kann und die Differenzierung der Wirbelkörper ausbleibt. Als physiologische Beispiele hierfür nennt er Kreuzbein, Steißbein, den Zahn des Epistropheus, die Metacarpalia und die Phalangen.

Im folgenden werden 2 Fälle von Klippel-Feil'schem Syndrom beschrieben, die in der Chirurgischen Universitätsklinik zu Münster (Westf.) beobachtet worden sind. Es handelt sich bei beiden um Personen weiblichen Geschlechts.

Fall 1. Sechzehnjähriges Mädchen. Schmal, graziler, zarter Knochenbau. Größe 1,52 m. Gewicht 46 kg. Der Kopf steckt tief zwischen den Schultern, der untere Rand des Kinnes befindet sich genau in Schulterhöhe.

Die linke Schulter steht etwas tiefer als die rechte. Der Kopf ist leicht nach rechts gebeugt und etwas nach links rotiert. Es zeigt sich eine deutliche Asymmetrie des Gesichts, die durch eine regelrechte Gesichtsskoliose mit der Konvexität nach links hervorgerufen wird. Von den Schultern aus setzt der Hals in gedrungener Kegelform an. Beiderseits bildet der M. trapezius mit dem M. levator scapulae eine mächtige Muskelkulisse, indem er die tief stehende Protuberantia occipitalis externa und das Acromion fast in gerader Linie verbindet. Es besteht eine leichte S-förmige Skoliose der Gesamtwirbelsäule. Die Beugungsfähigkeit des Kopfes beträgt nach allen Richtungen nur schätzungsweise 5 Grad von der Mittellinie aus. Die Drehbewegung des Kopfes ist nach rechts soweit möglich, daß das Kinn die Mittellinie erreicht, nach links ist sie nur angedeutet vorhanden. Die Entfernung Mastoid-Acromion beträgt rechts 13, links 17 cm. Umfang des Halses 41,5 cm. Umfang des Kopfes (Protuberantia-Augenbrauen) 53 cm.

Zum besseren Verständnis der folgenden Maßangaben diene die Figur 1 (Maßstab 1:5).




Figur 1.

Die Verbindungslinie von Acromion zu Acromion (A-A) ist 31 cm lang. Die Linea nuchae (Ansatz des M. trapezius) hat eine Länge von 8 cm. (N-N). Das von ihrem Mittelpunkt (Protuberantia-P) auf die zuerst genannte Verbindungslinie A-A gefällte Lot hat eine Länge von 6 cm. Dieses Maß führt den hohen Verkürzungsgrad des Halses

durch die Mißbildung deutlich vor Augen. Bei einem normalen Menschen müßte dieses Lot auf dieselbe Schulterbreite berechnet etwa 16 cm betragen. (Nach Abbildungen im Lehrbuch der Anatomie des Menschen von H. Braus berechnet.) Diese dem Normalen entsprechenden Verhältnisse sind in Figur 1 gestrichelt dargestellt. Die oben schon erwähnte Muskelkuliße ist wohl zum Teil eine Folge dieser statischen Veränderungen im Skelettsystem. Dies soll an Hand der Figur 2 gezeigt werden. (Maßstab 1:2.)

Es ist eine Körperhälfte dargestellt, der Einfachheit halber ist als Ansatz der Muskelkraft (a) einerseits das Acromion (A), andererseits die Protuberantia (P) angenommen worden. W ist der Schnittpunkt der Linie A-A mit der Wirbelsäule. Die normalen Verhältnisse sind gestrichelt, die pathologischen, unserem Falle entsprechenden, ausgezogen.



Figur 2 (Maßstab 1:2).

Man sieht, daß im Normalen die hebende Komponente *b* viel größer ist, als unter den in unserem Falle vorliegenden pathologischen Verhältnissen (bei gleicher Muskelkraft). Um die gleiche Leistung zu erzielen, muß die Muskulatur hypertrophieren und einen gestreckteren Verlauf annehmen.

Die inneren Organe zeigen keinen pathologischen Befund. Am Nervensystem finden sich keine krankhaften Veränderungen. (s. o.)

Röntgenologisch findet sich eine Verschmelzung der unteren Halswirbel, die auch den ersten und zweiten Brustwirbel umfaßt. (Masse cervicale.)

Wegen technischer Schwierigkeit bei der Röntgenaufnahme infolge Unbeweglichkeit des Kopfes ist nicht deutlich zu entscheiden, wie weit die oberen Halswirbel an der Synostose beteiligt sind. Selbst Aufnahmen durch den geöffneten Mund bringen keine Klarheit. Einzelne Wirbel sind nicht zu erkennen, dagegen sind verschiedene Zwischenwirbellöcher vorhanden. (s. o.) Die verschmolzenen Halswirbel zeigen außerordentlich atrophischen Knochenbau. (Inaktivitätsatrophie.) Spina bifida fehlt.

Fall 2. Zweijähriges Kind. Familienanamnese o. B., rechtzeitig geboren, zweite Schädellage. Im Alter von 8 Monaten Krämpfe. Wegen Verdachts auf abgeheilte Spondylitis tuberkulosa der Halswirbelsäule in die Klinik überwiesen.

Genügender Ernährungszustand. Ziemlich großer Kopf, der stark im Genick steht. Hals sehr kurz, seitlich vorpringende schwimnhautartige Hautfalten, die dem Rande des oberen Trapezius entsprechen. Der Muskel fühlt sich platt, dünn an. Der äußerste Rand ist etwas kräftiger, strangartig. Die Dornfortsätze sind nicht einzeln zu fühlen. Der 7. Halswirbel-Dornfortsatz ist deutlich, der 6. und 5. noch eben abgrenzbar, dann verschwinden die Dornfortsätze zwischen den stark angespannten Nackenmuskeln und unter dem nach hinten ausgezogenen Hinterhaupt. Der Kopf sitzt sozusagen auf den Schultern und ist schlecht beweglich. Die vorderen Halsmuskeln und der Sterno cleido sind vorhanden. An der

übrigen Wirbelsäule ist äußerlich nichts Pathologisches nachweisbar. Es finden sich weder grobe Ausfälle der Beweglichkeit noch des Gefühls. Die inneren Organe sind ohne nachweisbare Veränderungen. Pirquet'sche Probe negativ.

Der Röntgenbefund ergibt eine Mißbildung im Bereich der Halswirbelsäule. Die ersten 3 Halswirbel sind annähernd normal entwickelt, die übrigen Halswirbelkörper bilden eine verschmolzene Masse, in der Wirbelbogen nicht zu erkennen sind.

Die Fortschritte der Vererbungsbiologie haben die früheren Anschauungen über die Entstehungsurache der kongenitalen Mißbildungen (z. B. intrauterine Druckerhöhung, Fruchtwassermangel, amniotische Abknürungen) in den Hintergrund treten lassen. Das kongenitale Klippel-Feil'sche Syndrom ist auf eine Mutation des Idioplasmas zurückzuführen. Nach Erwin Baur sind sogenannte Faktormutationen bei Menschen sehr häufig; er glaubt, daß wohl der größte Teil der vielen erblichen Mißbildungen von solchen Mutationen herrührt. Da die große Mehrzahl der Mutationen dem recessiven Erbgang folgt, darf es bei der ausgesprochenen Seltenheit der Klippel-Feil'schen Mißbildung nicht wundernehmen, daß noch in keinem Fall familiär gehäuftes Auftreten gefunden wurde. Die familiäre Polyphaenie ist ein Charakteristikum der meisten kongenitalen Mißbildungen des Skelettsystems. Um eine Erbllichkeit unserer Mißbildung zu beweisen, wären systematische Familienuntersuchungen durchzuführen, wobei auf Deformitäten der Wirbelsäule, wie auf Synostosierung nur einzelner Wirbel zu achten wäre.

## Literatur - Verzeichnis.

1. Baur - Fischer - Lenz: Vererbungslehre und Rassenhygiene. Verlag Lehmann, München.
2. Boehm M.: Berl. Klin. Wjchr. 1909, S. 1485.
3. Boehm, Valentin und Partsch: Orthopäden-Kongreß 1925, Zeitjchr. f. orthop. Chir. 1925.
4. Braus, Lehrb. der Anatomie des Menschen, Verl. Springer Bd. 1, Fig. 127 u. 131.
5. Heidecker, H. Zbl. Chir. 1928, S. 568.
6. Ingelrans, P. Ztjchr. f. orthop. Chir. 1927, S. 474.
7. Kallius, H. U. Arch. f. Orthop. u. Unfall-Chir. 1931, S. 440.
8. Nilssonne, H. Zbl. Chir. 1928, S. 893.
9. Partsch, F. Ztjchr. f. orthop. Chir. 1925.
10. Siwon, P. Zbl. Chir. 1927, S. 3247.
11. Walter, H. Arch. f. orthop. u. Unfall-Chir. 1931, S. 225.
12. Partsch, F. Arch. f. orthop. u. Unfall-Chir. 1926, S. 199.



## Lebenslauf.

Ich, Hans Timmerkamp, wurde am 9. Mai 1905 als Sohn des Lehrers Carl Timmerkamp und seiner Ehefrau Maria geborene Brinkord geboren. Ich besuchte 4 Jahre die Volksschule zu Bünde i. W., dann war ich neun Jahre auf dem Realgymnasium zu Bünde, das ich Ostern 1924 mit dem Zeugnis der Reife verließ. Zunächst studierte ich 2 Semester Maschinenbau an der Technischen Hochschule zu Hannover. Ostern 1925 begann ich mein medizinisches Studium an der Universität zu Münster. Ostern 1927 bestand ich in Tübingen das ärztliche Vorexamen. Meine klinischen Semester verbrachte ich in Innsbruck und Münster, wo ich am 16. Juli 1930 das medizinische Staatsexamen bestand. Seit dem 1. August 1930 bin ich als Medizinal-Praktikant am Rodhus-Hospital zu Castrop-Rauxel tätig.

